

FERTIGOFOL BIORGA

ABONO COMPUESTO LÍQUIDO. SOLUCIÓN NPK.

NUTRICIÓN
DE SANGOSSE
IBÉRICA



Composición y Características

ELEMENTOS	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Co
Peso/Peso %	3,00	2,00	5,40										
Peso/Volumen (unidades en g/L)	37	25	25										

Formulación: **ABN: Activador Bio Nutricional**

Aplicación: **Foliar - Radicular**

Presentación: **10 L (600 L) palet**

Efecto acidificante sobre el caldo de aplicación: -

Forma: **Líquido - (SL)**

Conservación del producto: **18 meses**

Densidad: **1,225**

Condiciones de almacenamiento: **Almacenar al resguardo del frío.**

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme el reglamento CE 834/2007.



Intereses Agronómicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FERTIGOFOL BIORGA mejora el estado nutricional del cultivo. Utilizado en pulverización foliar activa el metabolismo de cada una de las células vegetales. Esta acción sobre el conjunto de la planta mejora la fotosíntesis y la capacidad de asimilación de los elementos minerales por el sistema radicular.

FERTIGOFOL BIORGA es un producto polivalente adecuado para numerosos cultivos. Está específicamente adaptado para la nutrición, estimulación y crecimiento del sistema vegetativo.

FERTIGOFOL BIORGA es un líquido compuesto por: · Melaza de remolacha (NK)
· Borde de pescado (P) · Aminoácidos (N)

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

- Efecto Activador bio-nutricional:
 - Aumento de las necesidades nutricionales del cultivo
 - Aumento de la absorción de nutrientes por las raíces
 - Reequilibrio de la alimentación
 - Aumento de la fotosíntesis y estimulación del crecimiento, efecto reverdeciente
 - Incremento del metabolismo de la planta, mayor resistencia a estrés
- Nutrición completa y rápida del cultivo. Absorción cercana al 100%
- Aporte de aminoácidos, nutrientes de absorción inmediata que "alimentan" el metabolismo de la planta, menor gasto de energía por la planta.

Modo de Empleo

DOSIS GENERAL

Concentración máxima 5% (5 L/hL de agua). · **Foliar:** 500 cc/hL por aplicación en todos los cultivos a lo largo de su crecimiento. · **Radicular:** 15 L/ha.

CULTIVOS	Aplicación Foliar		Aplicación Radicular	
	Nº DE APLICACIONES Y MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	Nº Y APLICACIÓN	DOSIS
FRUTALES	A lo largo del ciclo 3-5 aplicaciones con intervalos de 15 días.	5 L/ha	En intervalos de 15-20 días desde el inicio del ciclo	10-20 L/ha
CEREALES	Periodos: 1-2 aplicaciones en condiciones de difícil crecimiento	5L /ha		
CÍTRICOS	1-2 Aplicaciones en primavera, 1 en verano y 1-2 otoño con un intervalo de 15 días.	5 L/ha		
CULTIVOS HORTÍCOLAS	Realizar todas las aplicaciones necesarias con intervalos de 10-12 días.	5-7 L/ha		
FORRAJERAS	Aplicar después de cada corte	5 L/ha		
INDUSTRIALES	1-3 aplicaciones para aumentar rendimiento y activar la planta	5 L/ha		
OLIVO Y ALMENDRO	1ª Aplicación en inicio ciclo (primavera) 2ª a los 15 días 3ª Engorde	5 L/ha		
PATATA	Siembra: 1ª a 10 L/ha en inicio tuberización, 2ª y 3ª con intervalos de 15 días. Consumo: 3-4 aplicaciones a partir inicio tuberización, intervalos de 15 días.	5 L/ha		
PLATANERA Y PIÑA	De 3-5 aplicaciones a lo largo del crecimiento activo cada 15-20 días. En Piña fresca en 5ª y 6ª mes - Piña conserva en 8ª y 9ª mes.	5 L/ha		
VINA	3 aplicaciones: 1ª Inflorescencias separadas, 2ª Botones florales y 3ª Enero	5 L/ha		

CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

Para obtener una buena eficacia, utilizar un volumen de agua/ha suficiente para así lograr una repartición homogénea de la aplicación. Se recomienda tratar entre temperaturas de 6 y 25 °C. Evitar los tratamientos en casos de extrema sequía, humedad, heladas, lluvias o cuando se esperan estas condiciones extremas.

Agitar bien el envase para su homogeneización. Verter el producto de forma progresiva una vez esté el depósito de agua a medio llenar y el sistema de agitación en marcha. Mantener la agitación durante toda la aplicación. Enjuague el envase dos veces y limpie todo el equipo antes y después de su uso.

En caso de mezcla con otros productos, efectuar siempre una prueba previa. Igualmente puede consultar con DE SANGOSSE IBÉRICA para obtener consejo.

* Para cultivos desconocidos o bajo abrigo, realizar un test previo a la concentración del 2,5 % y observar su comportamiento.

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

> www.desangosseiberica.com

DE SANGOSSE
IBÉRICA

