

DE SANGOSSE
Ibérica



PVIDA[®] TRICO

**MEJORES RAÍCES
MEJORES CULTIVOS
MEJORES COSECHAS**

- ✓ **MEJORA LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS**
- ✓ **COMPITE EN LA RIZOSFERA FRENTE MICROORGANISMOS QUE PUEDEN AFECTAR A LAS RAÍCES DE LOS CULTIVOS**
- ✓ **AUMENTA LA FORTALEZA DE LA PLANTA, INCREMENTA SU CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN**
- ✓ **RESPETA EL MEDIOAMBIENTE Y AUMENTA LOS MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS PARA LOS CULTIVOS Y SUELOS**



PRODUCTOS
100%
RESPECTUOSOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE

COMPOSICIÓN

Tipo de enmienda orgánica: leonardita
 Contenido en Micorrizas: 0,001 %
 Contenido en bacterias de la rizosfera: 1×10^3 UFC/g
 Contenido en Trichoderma: 1×10^7 UFC/g



"Comercializado en España al amparo del Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 506/2013 por Reconocimiento Mutuo con Italia, donde está autorizado y se comercializa según el Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Número de Registro: 0031315/20."

LIFE

Perlas de Vida

PVIDA®TRICO

VOLVER A LOS ORÍGENES ES MIRAR AL FUTURO

PVIDA®TRICO es un producto de acción específica, a base de hongos micorrícicos, bacterias beneficiosas de la rizosfera y microorganismos del género *Trichoderma*.

La utilización del producto aporta tanto al cultivo como al suelo ventajas considerables. Los efectos de su aplicación son:

- **AUMENTO DE VIGOR, CRECIMIENTO, DESARROLLO Y FUERZA DE LA PLANTA**
- **FAVORECE EL DESARROLLO DE LA FLORA MICROBIANA Y DE LA FERTILIDAD DEL SUELO**
- **AUMENTO DEL SISTEMA RADICULAR Y SU PROTECCIÓN CONTRA CONDICIONES ABIÓTICAS DESFAVORABLES**
- **MEJORA LA ABSORCIÓN DEL AGUA Y DE LOS NUTRIENTES**
- **MAYOR RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS**

✓ **COMPITE EN LA RIZOSFERA
FRENTE A MICROORGANISMOS
NO DESEADOS**




PVIDA®TRICO MODO DE USO

- **Fertirrigación:** Cultivos de ciclo corto: 1-2 kg/ha, fraccionados a lo largo del ciclo de cultivo o vegetativo. Cultivos de ciclo largo: 2-4 kg/ha, fraccionados a lo largo del ciclo de cultivo o vegetativo. Como norma general repartir estas cantidades en 3-4 aplicaciones o 150-200 gramos/hectárea/semana.
 - **Semilleros:** 10-20 gramos/1000 plantas. Aplicar después de la germinación de las plántulas y repetir una segunda aplicación tan pronto como aparezcan las primeras hojas.
- ⓘ **INCOMPATIBILIDADES:** No superar la dosis recomendada. No utilizar con productos de reacción ácida, fertilizantes NPK, calcio, azufre, cobre, productos fungicidas o cualquier otro tipo de biocida.



SÍGUENOS EN



DE SANGOSSE IBÉRICA

Calle Pinadeta, 26
46930 Quart de Poblet (Valencia) - ESPAÑA
Tel. 96 141 22 12
info@desangosseiberica.com
www.desangosseiberica.com

DE SANGOSSE
Ibérica

