

VITROSYM® PLUS

SIENTE EL PODER DE LA UNIÓN MICORRIZA + TRICHODERMA

- ✓ **LA SIMBIOSIS MICORRÍCICA AYUDA** A LA PLANTA A MEJORAR LA ABSORCIÓN Y EL SUMINISTRO DE AGUA Y LOS NUTRIENTES, PARTICULARMENTE FÓSFORO Y POTASIO.
- ✓ **LA TRICHODERMA FAVORECE** EL AUMENTO DEL SISTEMA RADICULAR Y SU PROTECCIÓN CONTRA CONDICIONES ABIÓTICAS DESFAVORABLES.
- ✓ AUMENTA LA FORTALEZA DE LA PLANTA, **INCREMENTA SU CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN**

COMPOSICIÓN

Mín. número de esporas de *Rhizoglyphus sp.* 3300
en 1g de componente A

Mín. UFC de *Trichoderma harzianum* 1x10⁸
en 1g de componente B



Número de autorización de comercialización: 4995.

"Autorizado en República Checa con número de registro 4995 y comercializado en España al amparo del Reglamento (EU) 2019/515 del Parlamento Europeo y de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 506/2013 por Reconocimiento Mutuo".

LIFE

Perlas de Vida

VITROSYM® PLUS


LA UNIÓN HACE LA FUERZA

MÁS VIGOR
MÁS FUERZA
MÁS COSECHA

VITROSYM® PLUS contiene cepas seleccionadas de hongos micorrícicos arbusculares producidas en condiciones axénicas, hongo del suelo *Trichoderma harzianum*, microalgas secas de agua dulce y es portador inerte de diatomita.

La utilización del producto aporta tanto al cultivo como al suelo ventajas considerables. Los efectos de su aplicación son:

- **AUMENTO DE VIGOR, CRECIMIENTO, DESARROLLO Y FUERZA DE LA PLANTA**
- **FAVORECE EL DESARROLLO DE LA FLORA MICROBIANA Y DE LA FERTILIDAD DEL SUELO**
- **MAYOR RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS**



VITROSYM® PLUS MODO DE USO



Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme el reglamento RCE 834/2007

- **Aplicación en campo:** Dosis 200-600 g/ha de acuerdo con el número de plantas/goteros por ha. Mezclar con agua y aplicar a través del sistema de riego, previamente llenado con agua de enjuague durante 10 min. Se recomienda agitación constante de la mezcla durante su aplicación. Mantener post-riego durante 5 minutos para eliminar cualquier residuo del sistema. Si se aplica mediante pulverización sobre el suelo, el producto debe incorporarse al suelo después de la aplicación.
- **Aplicación de sustrato:** Dosis de 200-600 gr/m² de acuerdo con el número de plántulas producidas.

El producto debe estar en estrecho contacto con las raíces. La sobredosis es imposible: una dosis más alta asegurará un mejor desarrollo de la micorriza. **Almacenamiento:** conservar en envases originales cerrados a temperaturas de hasta 8°C, lejos de alimentos y productos alimenticios para animales, mantener fuera del alcance de los niños.

Importante: evite el uso de fungicidas sistémicos durante las 3 primeras semanas después de la aplicación. Un riego y una fertilización (con fertilizantes fosfatados en concreto) demasiado abundantes reducirán la eficiencia del producto.

SÍGUENOS EN



DE SANGOSSE IBÉRICA

Calle Pinadeta, 26
46930 Quart de Poblet (Valencia) - ESPAÑA
Tel. 96 141 22 12
info@desangosseiberica.com
www.desangosseiberica.com

DE SANGOSSE
Ibérica 